

**Uwagi i komentarze do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  
Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie  
zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia  
wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. Nr 203,  
poz. 168)**

**Wg pisma zn. GIWz.IX-400/HPAI-73/05 Zastępcy Głównego  
Lekarza Weterynarii Janusza Związka skierowanego do  
Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii**

W związku z otrzymaniem przez Głównego Lekarza Weterynarii licznych zapytań w zakresie interpretacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. Nr 203, poz. 1688), chciałbym wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości:

1. rozporządzenie nie dotyczy ptaków ozdobnych ( np. kanarków, papug itp.);
2. zapis § 1 pkt.3, dotyczącego zakazu utrzymywania drobiu (kur, kaczek, gęsi, kuropatw, strusi i innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów, indyków, przepiórek, perlic) na otwartej przestrzeni rozumieć należy jako konieczność przetrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych albo utrzymywania drobiu w ograniczonej, odgradzonej przestrzeni, która:
  - a. uniemożliwi dostęp drobiu, a w szczególności kaczek i gęsi do otwartych zbiorników wodnych i linii brzegowej rzek, jezior i rozlewisk wodnych,
  - b. uniemożliwi zanieczyszczenie paszy i wody odchodami i wydzielinami dzikich ptaków (zadawanie paszy i wody powinno odbywać się w pomieszczeniach);
3. W przypadku, gdy właściciel nie ma możliwości przetrzymywania drobiu grzebiącego lub wodnego w zamknięciu, istnieje możliwość ewentualnego przetrzymywania tych zwierząt w ograniczonym obszarze, np. na podwórzu ogrodzonym siatką z wolierą, jednakże pod stałym dozorem właścicielskim. Jednakże, w każdym przypadku, przetrzymywanie paszy, jej zadawanie ptakom oraz pojenie drobiu w gospodarstwie powinno odbywać się wewnątrz budynków, a woda używana do pojenia ptaków nie może pochodzić ze zbiorników wodnych, a jedynie może być używana woda z wodociągów lub z głębokich studni (studnie zabezpieczone odpowiednio przed zanieczyszczeniem wody przez dzikie ptaki) jak także ze źródeł strumieni w rejonach górskich.
4. W przypadku utrzymywania strusi lub innych bezgrzebieniowców, hodowca powinien zapewnić:
  - o ograniczenie obszaru przemieszczania się ptaków poprzez zmniejszenie wybiegów,
  - o organizację nadzoru nad ptakami przez pracowników ferm, tak, aby była możliwość kontrolowania wybiegów i udaremnienia dostępu dzikiego ptactwa do strusi i innych bezgrzebieniowych.

**Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii  
lek. wet. Janusz Związek**